



014004



高尿酸血症改善劑

優力康 錠 100 毫克**Euricon Tablets 100mg****【作用】**

本品為一有效的促尿酸排泄劑，其主要作用可能係經由抑制近腎小管對尿酸鹽之再吸收，能降低血清中尿酸之濃度，增加尿中尿酸鹽之排泄。痛風患者在每天口服單一劑量後，約能使血清中尿酸濃度降低 50% ~ 60%，故能有效減輕痛風性關節炎之症狀。本品口服後，2 ~ 3 小時即可達最高血中濃度，半衰期約 12 ~ 13 小時，主要經由腸道排出。

【成分】

每錠中含有 Benzbromarone 100mg.

【適應症】

痛風、高尿酸血症。

【用法・用量】

優力康錠 100 毫克：一天 1 ~ 2 次，一次 1 錠。

本藥須由醫師處方使用。

【警語】

1. 猛爆性肝炎等嚴重肝臟不良反應主要會在開始投藥前六個月內發生，因此最少在最初給藥六個月內，應定期進行肝功能檢查。
2. 在使用期間如有肝臟不良反應之症狀如：食慾不振、全身倦怠發生時，應立即停止使用本藥品，並到醫療院所就醫檢查。
3. 在使用本藥前須檢查肝功能，以確認有無肝臟疾病。並應告知病人使用本藥可能有肝臟疾病的副作用，如出現食慾不振、噁心嘔吐、疲倦虛弱、腹痛、下痢、發燒、深色尿液、結膜變黃等症狀，應停藥並立即就醫。

【禁忌】

- (一) 對本藥過敏者。
- (二) 嚴重肝功能不良。
- (三) 嚴重腎功能不良。
- (四) 尿酸性腎臟結石。
- (五) 懷孕及可能懷孕的婦女。

【注意事項】

1. 急性痛風發作時，不可開始使用本劑。
2. 本品具有顯著的血中尿酸降低作用，投與初期有誘發痛風之可能。
3. 尿呈酸性之場合，患者可能會因尿酸結石產生血尿，易引起腎絞痛等之症狀，為防止這種情況發生，須增加水分之攝取，使尿量增加及尿液鹼化。
但是在此情況下，須注意患者酸和鹽基之平衡。
4. 在使用本藥前須檢查肝功能，以確認有無肝臟疾病。並應告知病人使用本藥可能有肝臟疾病的副作用，如出現食慾不振、噁心嘔吐、疲倦虛弱、腹痛、下痢、發燒、深色尿液、結膜變黃等症狀，應停藥並立即就醫。
5. 長期投與時，應定期施行肝機能之各種檢查。
6. 腎功能異常之患者，建議酌予減量。
7. 重度肝功能異常之患者應小心使用。

【藥品相互作用】

本品會加強 Coumarin 系抗凝血劑之作用，在併用之場合時，須測定 prothrombin 的時間，並慎重投與。

【副作用】

1. 過敏症：偶有蕁麻疹、發疹、顏面發紅、紅斑、搔癢感。
2. 肝臟：GOT、GPT、Alkaliphosphatase 值之上升。
3. 消化器：偶有胃痛、腹痛、胃部不快感、胃灼熱、噁心、下痢、軟便等。
4. 其他：浮腫、心窩部不快感、頭痛。

【高齡者之投與】

一般對於高齡之患者，因其生理機能已低下，應注意減低使用劑量。

【孕婦之投與】

在動物實驗，曾有催畸形作用之報告，對於孕婦或有懷孕可能性之婦女，不可投與

【儲存條件】

本品應於 25℃ 以下儲存。

【賦形劑】

Euricon Tablets 100mg:

Latose Monohydrate、Corn Starch、Povidone K-30、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate

【包裝】

2 ~ 1000 錠，塑膠瓶裝；鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 G-6245 號
042147

健喬信元醫藥生技股份有限公司

藥商地址：303 新竹縣湖口鄉光復北路 21 巷 4 號
製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠
製造廠址：303 新竹縣湖口鄉工業一路 6 號

SLT0140C